

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

生薬製剤

第3類医薬品

# ヨクイニン錠

ヨクイニンはハトムギの名で広く知られている植物の種皮を除いた種子で、代表的な民間薬として古くから肌荒れやイボ取りに常用されて来ました。特に、半球形の隆起を呈し、軟質で表面に光沢のあるイボに奏効します。



## 〔使用上の注意〕



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	腹痛
皮膚	発疹

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 3ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 〔効能・効果〕

イボ、皮膚のあれ

## 〔用法・用量〕

次の量を食間又は空腹時に温湯にて服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
15才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守してください。

## 〔成分・分量〕

本品は12錠中

ヨクイニン末…………… 3,000mg

を含有する錠剤です。

添加物として、リン酸水素Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、クロスカルメロースNa、バレシヨデンブソ、乳糖を含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 乾燥剤は薬がなくなるまで捨てないでください。
- (5) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。が、効果には変わりありません。
- (6) ピンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## 〔お問い合わせ先〕

発売元 松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 松浦薬業株式会社

名古屋市中昭和区円上町24-21