

# 参蘇飲エキス〔細粒〕97

体力虚弱で、胃腸が弱い方の感冒やせきに効果があります。

## ⚠️ • 使用上の注意 •

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

生後3ヵ月未満の乳児



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ● 効能・効果 ●

体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：

感冒、せき

## ● 用法・用量 ●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人(15歳以上)	1 包	2.0 g	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.3 g	
7歳未満4歳以上	1/2包	1.0 g	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.7 g	
2歳未満	1/4包	0.5 g 以下	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。



71018867

●成分・分量●      本品3包(6.0g)又は6.0gは

ソヨウ……………0.5g	フクリョウ……………1.5g
キシツ……………0.5g	ニンジン……………0.75g
キキョウ……………1.0g	タイソウ……………0.75g
チンピ……………1.0g	ショウキョウ……………0.25g
カッコン……………1.0g	モッコウ……………0.5g
ゼンコ……………1.0g	カンゾウ……………0.5g
ハンゲ……………1.5g	

上記より製した参蘇飲水製エキス4.6g（乾燥物換算で約2.3gに相当）を含有する細粒剤です。添加物としてヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口  
TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21